

## ඡඩ වාහක වුවන් ඔබේ විවාහක සහකරු සහකාරීය වාහක නොවන අයෙකු නම් ...

ඩිය වීමට කිසිදු කාරණයක් නොමැති අතර, ඔබේ දරුවන් වාහක නොවන දරුවන් නො වාහක දරුවන් වේ. ඔබේ දරුවාගේ වයස අවුරුද්ද සම්පූර්ණ වූ පසු තැලසීමියා රැකිර පරීක්ෂණය සිදුකර ගන්න.

## ඡඩ සහ ඔබගේ විවාහක සහකරු සහකාරීය වාහක අයෙකු නම් ...

දෙමාපියන් දෙදෙනාගෙන්ම තැලසීමියා ජාන දරුවාට උරුම විය හැකි බැවින්, මහා තැලසීමියා රෝගී දරුවෙකු මෙවට බිජි විය හැක. විබැවන්, වෛද්‍ය උපදෙස් ගැනීම වැදගත් වේ.



## ඡඩ සිතට ගත යුතු දේ ...

- තැලසීමියා වාහකයෙකු යනු රෝගීයෙකු නොවේ.
- තැලසීමියා වාහක දුරුවෙශ් වාහක නොවන දරුවන් සේ සාමාන්‍ය පරිදි වර්ධනය වේ.
- තැලසීමියා රෝගී දරුවන් බිජිවීම වැලැක්විය හැකිය.

## ඔබේ යුතුකම ...

- වයස අවුරුදු 12 ට වැඩි සියලු දෙනාම තැලසීමියා වාහක පරීක්ෂණය සඳහා යොමු කරන්න.
- ඔබ තැලසීමියා වාහක අයෙකු නම්, විවාහය සඳහා වාහක නොවන අයෙකු තේරා ගන්න.



වැඩි විස්තර සඳහා -



ජාතික තැලසීමියා නිවාරණ වැඩසටහන  
බෝ නොවන රෝග කාර්යාලය  
සෞඛ්‍ය, පොෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය  
කොළඹ 10.



දුරකථන: 0112686393

මුද්‍රණය: රජයේ මුද්‍රණ නිශ්චත සංස්ථාව



තැලසීමියාවෙන තොර  
ශ්‍රී ලංකාවක

තැලසීමියා රෝග කිළුබදාව  
ඡඩ දැනගැ යුතු දේ කහ ඔබගේ වගකීම

## තැබුකීමියාව යනු කුමක් දේ?

- උපතින්ම ඇතිවන, රැඩිරයේ රතු රැඩිරාත්තුවල හිමෝග්ලොඩින් නිපදවීමේ උණුකාවක් නිසා හටගන්නා රෝගී තත්ත්වයකි.
- මෙය පරම්පරාවෙන් දෙම්විපියන්ගේ ජාත්‍ය මාරුගයෙන් දුරුවන්ට උරුම වේ.
- තැබුකීමියාවේ ප්‍රහේද 02 කි. විය තැබුකීමියා වාහකයේ සහ තැබුකීමියා රෝගීන් වශයෙනි.

## තැබුකීමියා වාහක තත්ත්වය යනු ...

- දෙම්විපියන්ගෙන් වික් තැබුකීමියා ජාත්‍යක් පමණක් උරුම වූ විට විය තැබුකීමියා වාහක තත්ත්වය ලෙස නඳුන්වයි.
- විවිධ රැඩිරයේ හිමෝග්ලොඩින් (Hb) මට්ටම තරමක් අඩු විය හැකි නමුද විය රෝගී තත්ත්වයක් ලෙස නොසැලකේ.
- තැබුකීමියා වාහක තත්ත්වය ගිරිරයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයට හා වර්ධනයට බලපෑමක් ඇති නොකරයි.
- තැබුකීමියා සම්බන්ධ විශේෂ රැඩිර පරීක්ෂණයකින් පමණක් වාහක තත්ත්වය තහවුරු කර ගත හැකිය.
- ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 4% ද වියුණු පළාතේ ජනගහනයෙන් 8% පමණ ද තැබුකීමියා වාහකයන් වේ.

- තැබුකීමියා වාහකයන් දෙදෙනෙකු අතර සිදුවන විවාහයක දී, මහා තැබුකීමියා රෝගී දුරුවකු ඉපදිමට හැකි බැවින්, විවාහයට පෙර ඔබගේ වාහක තත්ත්වය නිශ්චිත කරගන්න.

## තැබුකීමියා රෝගී තත්ත්වය යනු ...

- මව සහ පියා දෙදෙනාගෙන්ම තැබුකීමියා ජාත්‍ය උරුම වූ විට දුරුවාට තැබුකීමියා රෝගය වැළඳේ.
- මෙය පීවිත කාලය පුරාවටම බලපාන රෝගයකි.
- අධික සුදුමැලි බව, අක්මාව සහ ප්ලිහාවේ ඉදිමීම මෙහි ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණ වන අතර, පළමු මාස 4-8 තුළ මෙම ලක්ෂණ මතු වේ.

- පීටතින් රැඩිරය බඩාදීම ප්‍රධාන ප්‍රතිකාර කුමය වන අතර, මෙය මසකට වරක් පීවිත කාලය තුළදීම බඩා දිය යුතුය.
- රැඩිරය බඩා දීම නිසා ගැරිරයේ යකඩ විකතු වීම අනුළුව මෙම රෝගයේ සංකුලතා නිසා, මෙවැනි දුරුවන් රුක බලා ගැනීමේ දී ආර්ථික, සාමාජික සහ මානසික ගැටුම රැසකට මුහුණ දීමට දෙමාපියන්ට සිදු වේ.
- මේ නිසා තැබුකීමියා රෝගී දුරුවෙකු ඇතිවීම වැළැක්වීම ඉතා වැදගත් ය.

## තැබුකීමියා වාහක තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීමට

- සම්පූර්ණ රැඩිර සෙකුල ගණුනය කිරීමේ පරීක්ෂණය (FBC) සහ රැඩිර පටක පරීක්ෂාව (Blood Picture) මගින් රෝගය නඳුනාගන්නා අතර, HPLC/CE පරීක්ෂණය මගින් වාහක තත්ත්වය තහවුරු කළ හැකිය.
- තැබුකීමියා වාහක නොවන අය සඳහා හරිත පතක් ද (Green Card) වාහක අය සඳහා රෝග පතක් ද (Pink Card) බඩා දේ.

